

Soins des animaux à terre : les choses à faire et à ne pas faire

Tout animal (veau ou adulte, mâle ou femelle) qui est incapable de se relever devrait être traité de manière urgente.

Les bovins qui ne peuvent pas se relever sont soit trop faibles, malades ou blessés, et ils doivent être pris en charge immédiatement. À cet égard, un diagnostic rapide, un traitement approprié et une manipulation attentionnée maximiseront les chances de rétablissement.

Conformément aux directives de proAction^{MD}, tout le personnel qui manipule les animaux doit connaître les pratiques d'élevage et les techniques de manipulation en douceur afin d'éviter des situations d'animaux à terre. De plus, le personnel doit être formé sur la gestion efficace des animaux à terre afin de maximiser les chances de succès. Demandez aux membres de votre équipe et à votre médecin vétérinaire de s'impliquer dans l'élaboration de votre procédure normalisée (PN) pour que tous soient préparés à offrir les meilleurs soins possible.

Le tableau ci-dessous présente des directives de base sur ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsque l'on prend soin d'animaux à terre.

Déplacer des animaux à terre

À FAIRE	À NE PAS FAIRE
S'assurer qu'il y a assez de gens disponibles pour aider à déplacer les animaux en toute sécurité.	Transporter ou déplacer les animaux avec un serre-hanches : ● Cela peut causer des dommages aux hanches ou à la colonne vertébrale
Déplacer les animaux avec grand soin afin de prévenir d'autres blessures : ● Utiliser un harnais complet, une feuille de contreplaqué, un traîneau, un tapis de caoutchouc, une chargeuse, une chargeuse à benne ou une benne de tracteur	Tirer, pousser, traîner ou soulever les animaux par le cou ou par les pattes : ● Procéder de la sorte uniquement lors de situations extrêmes où la sécurité d'un animal ou d'une personne est compromise et qu'aucune autre solution n'est possible ● Dans un tel cas, procéder sur une très courte distance et n'appliquer de force que pendant un très court moment. Protéger l'animal le plus possible et, lorsqu'il est en sécurité, le déplacer à l'aide d'une méthode appropriée
Former les membres de l'équipe afin qu'ils connaissent votre PN pour la gestion des animaux à terre et soient ainsi préparés à intervenir si une telle urgence survient.	Utiliser un aiguillon électrique sur un animal incapable de se relever : ● Cela cause de la douleur et une détresse non nécessaires ** Les aiguillons électriques ne devraient être utilisés que dans des cas extrêmes, par exemple si la sécurité d'un animal est compromise. À titre d'exemple, un aiguillon électrique peut être utilisé une seule fois et en dernier recours pour déterminer si un animal est capable de se relever. Si l'animal ne répond pas, l'aiguillon ne doit plus être utilisé. **

Soulever les animaux à terre

À FAIRE	À NE PAS FAIRE
Encourager l'animal à se relever en se servant d'un harnais complet, d'un serre-hanches ou d'une piscine portative et en usant d'une extrême prudence.	Transporter ou déplacer les animaux avec un serre-hanches : ● Cela peut causer des dommages aux hanches ou à la colonne vertébrale
Utiliser des techniques de manipulation en douceur.	Utiliser un serre-hanches sur des animaux qui ne peuvent pas supporter leur poids ou ne peuvent pas se relever avec de l'assistance.

Loger des animaux à terre

À FAIRE	À NE PAS FAIRE
S'assurer que les animaux sont logés sur une surface antidérapante et sur une litière abondante, propre, fraîche et profonde, et qu'ils sont supervisés régulièrement. ● Fournir des balles aux animaux afin qu'ils puissent se coucher sur le ventre (ou « s'asseoir ») ● S'assurer que leurs pattes arrière sont repliées près de leur flanc ● Utiliser une lampe à infrarouge pour réchauffer les veaux en bas âge ● Protéger les animaux contre les éléments (p. ex. fournir de l'ombre s'ils sont au soleil) ● Fournir un accès facile et fréquent à de l'eau et des aliments frais	Laisser l'urine et le fumier s'accumuler à l'endroit où les animaux à terre sont couchés : ● Des infections ou des plaies aux articulations peuvent survenir lorsque les animaux sont couchés sur de la litière mouillée ● Les vaches en lactation dont le pis n'est pas maintenu propre et sec peuvent développer une mammite ● Une litière mouillée peut contribuer à une infection du nombril chez les veaux en bas âge

Prévenir les blessures supplémentaires chez les animaux à terre qui pourraient être causées par :

- Des animaux qui leur marcheraient dessus
- Les dalots
- Les racleurs
- Les clôtures électriques
- Les prédateurs

Laisser les animaux complètement couchés sur le côté ou sur des surfaces dures pendant de longues périodes :

- Les atteintes musculaires et nerveuses se produisent très rapidement

Prendre soin des animaux à terre

À FAIRE

Déterminer pourquoi un animal n'est pas capable de se relever :

- **Problèmes métaboliques :** certains problèmes courants sont, entre autres, des déséquilibres minéraux (calcium, phosphore)
- **Problèmes infectieux :** le plus souvent des cas de mammite toxique chez les vaches et de diarrhée chez les veaux
- **Problèmes nutritionnels :** carences en vitamines et minéraux
- **Blessures :** blessures issues du vêlage; fractures aux membres, au dos ou aux hanches; blessures à un tissu mou après qu'un animal ait glissé et chuté; blessures à un animal resté coincé; boiterie grave; perte de sang
- Déplacer soigneusement l'animal vers une zone confortable recouverte de litière ou encore le traiter et le soigner sur place

Réaliser un examen physique complet :

- Observer si l'animal est alerte et s'il est capable de se coucher sur le ventre
- Évaluer et consigner sa fréquence respiratoire, sa fréquence cardiaque, sa température, la couleur des muqueuses et son niveau d'hydratation
- Chez les vaches en lactation, tirer quelques jets et examiner le lait

Soulager la douleur au moyen d'un anti-inflammatoire non stéroïdien selon les directives du médecin vétérinaire.

Traire régulièrement les animaux en lactation pour empêcher un engorgement mammaire douloureux.

Fournir de l'eau dans un seau qui est difficile à renverser ou offrir de l'eau toutes les heures.

À NE PAS FAIRE

Laisser l'animal sans avoir déterminé pourquoi il ne peut pas se relever :

- Il s'agit d'une situation urgente
- En cas de blessure grave, euthanasier l'animal rapidement

Hésitez à communiquer à communiquer avec votre médecin vétérinaire pour un examen complet et un diagnostic si vous ne connaissez pas le problème sous-jacent ou pour obtenir des recommandations sur le traitement nécessaire au rétablissement.

Laisser les animaux souffrir sans soulager la douleur.

Laisser des fuites de lait, du fumier ou de l'urine s'accumuler à l'endroit où les vaches en lactation sont couchées :

- Cela accroîtra le risque de mammite et de plaies

Laisser les animaux se déshydrater, ce qui exacerbera leurs problèmes de santé.

Offrir des aliments faciles à digérer, comme du foin aux bovins et du lait aux veaux.

Donner du lait à l'aide d'un tube aux veaux qui ne veulent pas boire :

- Le lait offert en tube se dépose dans le rumen et fermente, ce qui peut causer l'acidose

Fournir des liquides par voie intraveineuse aux veaux déshydratés.

Donner du lait à l'aide d'un tube aux veaux qui ne peuvent pas se relever :

- Le risque d'aspiration (liquide dans les poumons) est élevé, ce qui peut contribuer au développement d'une pneumonie

Faire rouler l'animal doucement d'un côté à l'autre plusieurs fois par jour (idéalement toutes les 2 heures).

Laisser les animaux dans la même position, ou complètement sur le côté pendant plus que quelques heures.

- Cela contribue aux atteintes musculaires et nerveuses

Prendre des décisions concernant les animaux à terre

À FAIRE

À NE PAS FAIRE

Surveiller les animaux à terre de près et déterminer si leur condition s'améliore ou si elle se détériore.

Laisser les animaux à terre pendant plus de 2 jours :

- Plus ils resteront couchés longtemps, plus leurs chances de rétablissement seront réduites

Euthanasier les animaux qui sont coincés et qui ne peuvent pas être déplacés de manière sécuritaire ou sans cruauté.

Tirer, pousser, traîner ou soulever les animaux par le cou ou par les pattes :

- Procéder de la sorte uniquement lors de situations extrêmes où la sécurité d'un animal ou d'une personne est compromise et qu'aucune autre solution n'est possible
- Dans un tel cas, procéder sur une très courte distance et n'appliquer de force que pendant un très court moment. Protéger l'animal le plus possible et, lorsqu'il est en sécurité, le déplacer à l'aide d'une méthode appropriée

Euthanasier les animaux qui éprouvent de la douleur, qui souffrent de blessures ou de maladies graves et dont l'état est peu susceptible de s'améliorer, ou qui ne répondent pas aux traitements dans le délai approprié.

Déplacer un animal euthanasié ou le laisser seul avant d'avoir confirmé son décès à l'aide des indicateurs suivants :

- Ne respire plus
- N'a plus de rythme cardiaque
- Ne cligne pas lorsque l'on touche à son œil (pas de réflexe cornéen, ce qui indique une perte de conscience)

Communiquer avec votre médecin vétérinaire pour obtenir des conseils, ou pour vous aider avec l'euthanasie si vous ne savez pas exactement comment procéder ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la procédure.

Laisser les animaux à terre souffrir :

- Faites la bonne chose pour l'animal; s'il ne montre pas de signes de rétablissement, l'euthanasie est la meilleure option à considérer