

Bien-être animal



Évaluation en bref de la cote d'état de chair

L'évaluation de la cote d'état de chair permet d'établir si un animal est trop maigre, trop gras, ou dans un état idéal. L'échelle est graduée de 1 (animal émacié) à 5 (animal gras).

- ❖ Évaluer la cote d'état de chair de l'animal afin de déterminer s'il est trop maigre :
 - s'il est trop maigre ou requiert des mesures correctives (c.-à-d. un pointage de ≤ 2)
 - s'il a une cote d'état de chair acceptable (pointage de >2)
- ❖ Deux outils :
 - Figure 1 : Tableau des cotes d'état de chair
 - Figure 2 : Guide d'évaluation de la cote d'état de chair

Figure 1 : Tableau des cotes d'état de chair

	Acceptable				Requiert des mesures correctives	
Cote	3	2,75	2,5	2,25	2	< 2
Région pelvienne	V	V	V	V	V	V
Os de la hanche	arrondis	angulaires	angulaires	angulaires	angulaires	angulaires
Os de la fesse	enrobés	enrobés	angulaires, gras palpable	angulaires, aucun gras palpable	angulaires, aucun gras palpable	angulaires, aucun gras palpable
Côtes	ondulations non visibles	ondulations non visibles	ondulations non visibles	ondulations visibles à mi-distance entre la pointe et le bout des côtes	ondulations visibles aux 3/4 de la distance entre la pointe et le bout des côtes	ondulations visibles aux 3/4 de la distance entre la pointe et le bout des côtes
					articulation de la cuisse non saillante	articulation de la cuisse saillante

Source : Vasseur E., J. Gibbons, J. Rushen, A. M. de Passillé, 2014. *Development and implementation of a training program to ensure high repeatability of body condition score of dairy cows.* J. Dairy Sci. 96:4725-4737

Figure 2 : Guide d'évaluation de la cote d'état de chair – cotes 2 et 3

Remarque : pour avoir la description des 5 cotes d'état de chair, consultez l'Annexe E du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers ou l'Annexe II du Manuel de référence proAction^{MD}.

Acceptable

Pointage 3

BOUTS DE CÔTE :

- On peut sentir l'extrémité des vertèbres en appliquant une légère pression;
- Les côtes semblent recouvertes et l'aspect en surplomb des os a disparu;
- L'effet de planche à laver est beaucoup moins apparent.

COLONNE VERTÉBRALE :

- Les vertèbres de l'échine, de la longe et de la croupe prennent une forme arrondie;
- L'échine est visible, mais on ne voit pas les vertèbres individuelles.

OS DE LA HANCHE ET ISCHION :


- Les os sont visibles, arrondis, et sans aspérité;
- Coussinet adipeux palpable.

ARTICULATION DE LA CUISSE (région située au-dessus du bassin) :

- On note un creux en forme de U.

ATTACHE DE LA QUEUE :

- Les deux côtés de l'attache de la queue sont légèrement affaissés, mais les plis cutanés ne sont plus apparents;
- Les ligaments partant des ischions vers la colonne vertébrale ont une apparence arrondie.



Requiert des mesures correctives

Pointage 2

BOUTS DE CÔTE :

- Les os de la croupe ne sont pas aussi proéminents qu'au pointage 1, mais on peut tout de même les sentir;
- On peut sentir les extrémités des vertèbres au toucher; le coussinet adipeux est mince et la vache semble avoir une apparence légèrement plus ronde;
- L'apparence de planche à laver est moins évidente.

COLONNE VERTÉBRALE :

- Les vertèbres de l'échine, de la longe et de la croupe sont moins visibles;
- Les vertèbres individuelles sont faciles à sentir au toucher.

OS DE LA HANCHE ET ISCHION :


- Les os sont proéminents et angulaires;
- Aucun coussinet adipeux palpable.

ARTICULATION DE LA CUISSE (région située au-dessus du bassin) :

- Le creux en forme de V est un peu moins prononcé;
- Le coussinet adipeux est légèrement plus important.

ATTACHE DE LA QUEUE :

- Les deux côtés de l'attache de la queue sont affaissés et reculés;
- Les ligaments partant des ischions vers la colonne vertébrale sont très bien définis.



Source : Extrait de l'Annexe E du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, 2009.