

# Liste de contrôle de réforme



Des recherches récentes menées à l'Université de Guelph ont conduit à l'élaboration d'une liste de contrôle pour aider les producteurs à évaluer l'aptitude au transport. Les producteurs utilisant cet outil ont constaté qu'ils avaient davantage confiance en eux lorsqu'ils expédiaient des vaches de réforme.


Réfléchissez à ces éléments avant d'expédier une vache :	Mesurez et consignez :	Exigences fédérales en vue du transport	Encerclez votre réponse	
Sa température corporelle est-elle anormale?	Température corporelle : Précisez <input type="checkbox"/> °C or <input type="checkbox"/> °F _____	Sa température corporelle est-elle <b>inférieure</b> à 37,9 °C (100,2 °F) ou <b>supérieure</b> à 39,5 °C (102,5 °F)?	Oui	Non
Est-elle trop maigre?	Note d'état de chair sur une échelle de 5 points (voir la page suivante)	A-t-elle une note de 2 ou moins?	Oui	Non
Souffre-t-elle de boiterie?	Note de démarche sur une échelle de 5 (voir la page suivante)	A-t-elle une note de 3 ou plus?	Oui	Non
À quel stade de lactation est-elle rendue?	Production laitière actuelle _____	Faut-il la traire régulièrement?	Oui	Non
A-t-elle des résidus de médicaments?	Dernier traitement : (jj/mm/aa) _____	Est-elle encore dans la période de retrait pour le lait ou la viande?	Oui	Non
Est-elle atteinte de mammite?	La mammite est-elle présente dans un quartier : <b>AvD    ArrD</b> <b>AvG    ArrG</b>	Y a-t-il présence d'une mammite modérée à sévère? ( <b>enflure ou rigidité du pis</b> )	Oui	Non
Y a-t-il d'autres problèmes?	<b>Encerclez chacun des problèmes observés :</b> <input type="checkbox"/> Yeux enfoncés <input type="checkbox"/> Terne et épuisée <input type="checkbox"/> Torsion de l'estomac <input type="checkbox"/> Diarrhée <input type="checkbox"/> Abscès <input type="checkbox"/> Chirurgies <input type="checkbox"/> Enflure/bosses <input type="checkbox"/> Écoulement nasal <input type="checkbox"/> Écoulement de la vulve	Y a-t-il des problèmes visibles qui seraient inacceptables pour la mise en vente?  (dans le doute, vérifiez auprès du médecin vétérinaireunsure)	Oui	Non



Si vous avez répondu « Oui » à une des questions ci-dessus, IL NE FAUT PAS EXPÉDIER cette vache OU il faut déterminer si elle peut être expédiée avec des dispositions spéciales

# Comment évaluer l'état de chair?

Pour repérer les vaches dont l'état de chair est faible ou qui sont émaciées (< 2), il faut examiner plusieurs caractéristiques :



## 1 Bouts de côte (apophyses transverses)

- Extrémités des côtes pointues au toucher
- Longe proéminente ressemblant à une planche à laver
- Ondulations en dents de scie des vertèbres visibles sur le dos et sur la croupe

## 2 Épine dorsale

- Os du dos et de la croupe proéminents
- Vertèbres individuelles évidentes

## 3 Os de la hanche et ischions

- Os saillants ayant une apparence très angulaire
- Aucun dépôt adipeux apparent

## 4 Articulation de la cuisse (région située au-dessus du bassin) :

- Creux évident en forme de V, sans dépôt adipeux

## 5 Attache de la queue

- Régions de chaque côté de l'attache de la queue affaissées et reculées avec des replis cutanés évidents
- Ligaments partant des ischions vers la colonne vertébrale très bien définis

Consultez le site [www.producteurslaitiers.ca/proaction](http://www.producteurslaitiers.ca/proaction) pour plus de renseignements sur l'évaluation de l'état de chair.

## L'essentiel

L'utilisation d'une telle liste de contrôle peut aider à prendre la décision d'expédier ou non une vache. Elle peut également servir de preuve que la vache était en bon état avant son transport. Envisagez d'établir une liste de contrôle pour votre ferme en consultation avec vos conseillers en élevage.

## Comment évaluer la boiterie?

Il est difficile d'évaluer la boiterie car il peut y avoir des différences subtiles dans l'attribution de certaines notes. Collaborez avec votre médecin vétérinaire afin d'identifier précocement les vaches boiteuses et d'accroître vos connaissances sur le sujet.

**Pour pouvoir expédier une vache, elle doit avoir une note de 1 ou 2 à la démarche, ce qui signifie qu'elle n'est PAS boiteuse. Le Tableau 1 ci-dessous fournit une description de chaque note de boiterie :**

Note	Description	Critères comportementaux
saine <b>1</b>	Mouvement lisse et fluide	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dos plat à l'arrêt et à la marche.</li><li>• Tous les membres du corps supportent le poids également.</li><li>• Les articulations fléchissent librement.</li><li>• Port de tête demeurant constant lorsque l'animal bouge.</li></ul>
<b>2</b>	Capacité à se déplacer librement non diminuée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dos plat ou faiblement arqué à l'arrêt et en marchant.</li><li>• Tous les membres du corps supportent le poids également.</li><li>• Les articulations sont légèrement raides.</li><li>• Port de tête demeurant constant lorsque l'animal bouge.</li></ul>
<b>3</b>	Capacité de se déplacer, mais la capacité à se déplacer librement est compromise	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dos plat ou arqué à l'arrêt, mais courbé de manière évidente à la marche.</li><li>• Une légère boiterie peut être observée à l'un des membres.</li><li>• Les articulations montrent des signes de raideur, mais cela n'empêche pas la liberté de mouvement.</li><li>• Port de tête demeurant constant lorsque l'animal bouge.</li></ul>
<b>4</b>	Capacité à se déplacer librement est diminuée de manière évidente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dos manifestement courbé à l'arrêt et à la marche.</li><li>• Réticence à porter son poids sur au moins un des membres, mais utilise tout de même ce membre lors de la marche.</li><li>• Les foulées sont hésitantes et délibérées et les articulations sont raides.</li><li>• La tête se balance légèrement de haut en bas lorsque l'animal bouge et que le sabot blessé entre en contact avec le sol.</li></ul>
<b>5</b>	Capacité à se déplacer sérieusement réduite. Doit être vigoureusement encouragée à se lever ou à bouger	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dos extrêmement arqué à l'arrêt et à la marche.</li><li>• Incapacité à porter son poids sur un ou plusieurs membres.</li><li>• Raideur manifeste de l'articulation, caractérisée par un manque de flexion de l'articulation, avec des foulées très hésitantes et délibérées.</li><li>• Une ou plusieurs foulées manifestement raccourcies.</li><li>• La tête de l'animal se balance manifestement à la marche et lorsque le sabot blessé entre en contact avec le sol.</li></ul>

Source: University of British Columbia Welfare Program



L'évaluation de la boiterie dans les stalles entravées peut s'avérer un peu plus délicate. Il existe un mode d'évaluation accepté de la boiterie en stalle qui est utilisé pour proAction<sup>MD</sup> et qui peut aider à identifier les cas de boiterie dans ce système de logement. Cependant, comme vos animaux vont monter dans un camion et auront à marcher à l'autre extrémité du trajet, il est recommandé de recourir à l'évaluation de la démarche. C'est d'ailleurs de cette façon que vos animaux seront évalués à la fin du trajet!

Consultez le site [www.producteurslaitiers.ca/proaction](http://www.producteurslaitiers.ca/proaction) pour plus de renseignements et des vidéos sur l'évaluation de la boiterie.



== PARTENARIAT  
== CANADIEN pour  
== L'AGRICULTURE



Canada